

Recommended Well-Child and Well-Care Visits and Vaccines



Well-Child and Well-Care Visits along with recommended vaccines help your child grow and stay healthy at every age.

Follow the American Academy of Pediatrics (AAP) schedule of doctor visits and vaccines to keep them strong and thriving!

Birth to 1 year

- At birth** **Hep B** (Hepatitis B – in hospital)
- 2 to 5 days** Well-baby visit (no vaccine)
- 1 month** Well-baby visit (no vaccine)
- 0-2 months** **Hep B** (Hepatitis B), **DTaP** (Diphtheria, Tetanus, Pertussis), **PCV** (Pneumo), **Hib** (Haemophilus Influenza Type B), **Polio** (IPV), and **Rotavirus**
- 4 months** **DTaP** (Diphtheria, Tetanus, Pertussis), **PCV** (Pneumo), **Hib** (Haemophilus Influenza Type B), **Polio** (IPV), and **Rotavirus**
- 6 months** **DTaP** (Diphtheria, Tetanus, Pertussis), **PCV** (Pneumo), **Hib** (Haemophilus Influenza Type B), **Polio** (IPV), **Hep B** (Hepatitis B), **Rotavirus**, and the **flu vaccine***
- 9 months** Well-baby visit: **Hgb** (hemoglobin) checked (no vaccine)
- 12 months** Blood lead screening **MMR** (Measles, Mumps and Rubella), **Varicella** (Chicken Pox), and **Hep A** (Hepatitis A)

Toddler years 15 months to 4 years

- 15 months** **DTaP** (Diphtheria, Tetanus, Pertussis), **Hib** (Haemophilus Influenza Type B), and **PCV** (Pneumo)
- 18 months** **Hep A** (Hepatitis A)
- 2-3 years** Annual well-child visit, possible blood lead screening
- 4 years** **DTaP** (Diphtheria, Tetanus, Pertussis), **Polio** (IPV), **MMR** (Measles/ Mumps/ Rubella), and **Varicella** (Chicken Pox)

5 to 12 years

- 5-8 years** Annual well-child visit
- 9-10 years** **HPV** (2-dose series of vaccines)
- 11-12 years** **Tdap** (Tetanus/ Diphtheria/ Acellular Pertussis) and **Meningococcal ACWY**, **HPV** (if not done previously)

Teen years 13 to 18 years

- 13-15 years** Annual well-child visit
- 16 years** **Meningococcal B** (2 doses) and **Meningococcal ACWY** (Meningitis)
- 17-18 years** Annual well-child visit

* Children six months and older should receive annual flu shots during the fall season.



Visitas de control y bienestar infantil, y vacunas recomendadas



Las visitas de control y de bienestar infantil, junto con las vacunas recomendadas, ayudan a que sus hijos crezcan y se mantengan saludables a cualquier edad.

¡Siga el calendario de consultas médicas y vacunación de la Academia Americana de Pediatría (AAP) y ayúdelos a crecer fuertes y sanos!

Desde el nacimiento hasta 1 año

Al nacer **Hep B** (Hepatitis B - en el hospital)

2 a 5 días Visita de control del bebé sano (sin vacuna)

1 mes Visita de control del bebé sano (sin vacuna)

0-2 meses **Hep B** (Hepatitis B), **DTaP** (Difteria, Tétanos, Tos ferina), **PCV** (neumo), **Hib** (Haemophilus influenzae Tipo B), **Polio** (IPV) y **Rotavirus**

4 meses **DTaP** (Difteria, Tétanos, Tos ferina), **PCV** (neumo), **Hib** (Haemophilus Influenza Tipo B), **Polio** (IPV) y **Rotavirus**

6 meses **DTaP** (difteria, tétanos, tos ferina), **PCV** (neumococo), **Hib** (Haemophilus influenzae tipo B), **Polio** (IPV), **Hep B** (Hepatitis B), **Rotavirus** y la **vacuna contra la gripe***

9 meses Visita de bebé sano: **Hgb** (hemoglobina) comprobado (sin vacuna)

12 meses Prueba de detección de plomo en sangre **MMR** (sarampión, paperas y rubéola), **varicela** y **Hep A** (Hepatitis A)

Años de infancia 15 meses a 4 años

15 meses **DTaP** (difteria, tétanos, tos ferina), **Hib** (Haemophilus influenzae tipo B) y **PCV** (neumo)

18 meses **Hep A** (Hepatitis A)

2-3 años Visita anual de niño sano, posible prueba de detección de plomo en sangre

4 años **DTaP** (difteria, tétanos, tos ferina), **polio** (IPV), **MMR** (sarampión/paperas/rubéola) y **varicela**

5 a 12 años

5-8 años Visita anual de niño sano

9-10 años **VPH** (serie de vacunas de 2 dosis)

11-12 años **Tdap** (tétanos/difteria/tos ferina acelular) y **meningococo ACWY**, **VPH** (si no se realizó previamente)

Años de adolescencia 13 a 18 años

13-15 años Visita anual de niño sano

16 años **Meningococo B** (2 dosis) y **Meningococo ACWY** (Meningitis)

17-18 años Visita anual de niño sano

* Los niños de seis meses o más deben recibir la vacuna anual contra la gripe durante la temporada de otoño.

